

TABLEAU CRITÈRES DE REMBOURSEMENT 24 MARS 2016

HOLKIRA PAK		PATIENTS DE GÉNOTYPE 1	HARVONI		
12sx	24sx		8sx	12sx	24sx
		Année 2			
		Génotype 1a, score de fibrose F3, F2, F1 plus un facteur de risque***, naïfs (jamais traités)			
		Génotype 1a, score de fibrose F3, F2, F1 plus un facteur de risque***, échec à INF+RBV*			
		Génotype 1a, score de fibrose F3, F2, F1 plus un facteur de risque***, avec échec à INF+RBV+IP**			
		Génotype 1b, score de fibrose F3, F2, F1 plus un facteur de risque***, naïfs (jamais traités)			
		Génotype 1b, score de fibrose F3, F2, F1 plus un facteur de risque***, avec échec à INF+RBV			
		Génotype 1b, score de fibrose F3, F2, F1 plus un facteur de risque***, avec échec à INF+RBV+IP**			
		Génotype 1a, score de fibrose F4, naïfs (jamais traités)			
		Génotype 1a, score de fibrose F4, recruteurs ou répondeur partiel IFN+RBV*			
		Génotype 1a, score de fibrose F4, réponse nulle IFN+RBV*			
		Génotype 1a, score de fibrose F4, échec IFN+RBV+IP**			
		Génotype 1b, score de fibrose F4, naïfs (jamais traités)			
		Génotype 1b, score de fibrose F4, échec IFN+RBV*			
		Génotype 1a, score de fibrose F4, échec IFN+RBV+IP**			
		Cirrhose décompensée			
		En attente de transplantation			
		Post greffe			
		* Interféron + ribavirine			
		** Interféron + ribavirine + Inhibiteur de protéase			
		Monothérapie			
		Si la CV est inférieure à 2,2millions UI/ml (trousse Abbott) ou CV inférieure à 6 millions UI/ml (trousse Roche)			
		Avec ribavirine			
		Si contre-indication ou intolérance à la ribavine			

***** Facteurs de risque**

- manifestations extra-hépatiques graves de l'hépatite C (ex. cryoglobulinémie mixte de type II ou III avec atteintes d'organes, vasculite, néphropathie, lymphome non hodgkinien à cellules B);
- co-infection par le VIH ou le VHB;
- autre maladie du foie (ex. stéato-hépatite non alcoolique);
- diabète de type 2;
- porphyrie cutanée tardive.